

◆レジメンマスタ確認シート◆

【 《6週毎400mg》 キイトルーダ 】

レジメン番号 02500015

対象がん種 【MSI-High】 固形癌

レジメン名 《6週毎400mg》キイトルーダ

インターバル日数 42日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																											
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 キイトルーダ点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食(100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:0.22µmインラインフィルター使用	400 1	400 mg 本	○																											
				<<以下余白>>																											

備考 希釈後の濃度は1~10mg/mL以内。

◆レジメンマスタ確認シート◆

【《6週毎400mg》キイトルーダ】

レジメン番号

02500015

対象がん種

【MSI-High】 固形癌

レジメン名

《6週毎400mg》キイトルーダ

インターバル日数

42日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																
				29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																		
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本																																
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 キイトルーダ点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食(100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:0.22μmインラインフィルター使用	400 1	400 mg 本																																
				<<以下余白>>																															

備考 希釈後の濃度は1~10mg/mL以内。

--