◆レジメンマスタ確認シート◆

【mFOLFOX6インフューザー+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260053

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザー+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴(レジメン) 13:00			○													
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1	本														
	◆施行者F：血管確保																
2	★側管点滴(レジメン) 13:00-13:30 30分かけて			○													
	劇 アバスチン点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5 mg/kg														
	劇 アバスチン点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5 mg/kg														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本														
3	★側管点滴(レジメン) 13:30-14:00 30分かけて			○													
	劇 グラニセトロン点滴バッグ「HK」(3mg100mL)	1	本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V														
4	★側管点滴(レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて			○													
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg)	200	220 mg/m²														
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg)	200	220 mg/m²														
	ブドウ糖[光糖液] 5% (250mL)	1	本														
	◆施行者F：エルプラットと同時																
5	★側管点滴(レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて			○													
	毒 ★エルプラット点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5 mg/m²														
	ブドウ糖[光糖液] 5% (250mL)	1	本														
	◆施行者F：レボホリナートと同時																
6	★側管一時点滴(レジメン) 16:00			○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440 mg/m²														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本														
	◆施行者F：全開																
7	★持続点滴(レジメン) 16:00-14:00 46時間かけて			○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640 mg/m²														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	92 mL	0														
	◆施行者F：インフューザー																
	<<以下余白>>																

備考	