

◆レジメンマスタ確認シート◆

【 FOLFIRI+Bev (2回目以降30分) 】

レジメン番号 02260283

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																									
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 血管確保。	1	本	○																								
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本	○																								
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 ク [®] ラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] [HK] (3mg100mL) デキササート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																								
4	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて [レジメン]レホ [®] ホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レホ [®] ホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																								
5	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピ [®] ーラ (100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	150 1	165 mg/m ² 本	○																								
6	★持続点滴 (レジメン) 15:00-14:00 23時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハ [®] ック [®] 【1L】 「フソ [®] 」 ◆施行者F: 23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m ² 本	○																								
7	★側管一時点滴 (レジメン) 16:00 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 全開で。	400 1	440 mg/m ² 本	○																								
<次頁に続く>																												

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号 02260283

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	★持続点滴 (レジメン) 16:00-15:00 23時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トール」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハック 【1L】 「フソー」 ◆施行者F:23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m ² 本	○															
<<以下余白>>																			

備考