◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ+Bev(初回90分)】

レジメン番号　02260073

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ+Bev(初回90分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00			
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保用			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:30　90分かけて			
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5	mg/kg
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5	mg/kg
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:30-15:00　30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00　2時間かけて			
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：イリノテカンと同時			
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00　2時間かけて			
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	150	165	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：レボホリナートと同時			
6	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00			
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：全開			
7	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-15:00　46時間かけて			
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	92 mL	0	
	◆施行者F：ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ			

<<以下余白>>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	○													
2	○													
3	○													
4	○													
5	○													
6	○													
7	○													

備考	