

◆レジメンマスタ確認シート◆

【 FOLFOXIRI (インフューサー) + Bev (2回目以降30分) 】

レジメン番号 02260640

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFOXIRI (インフューサー) + Bev (2回目以降30分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																	
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 グラネセトロン点滴ハック「HK」(3mg/100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 アハステチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハステチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食(100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本	○																
4	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:00 60分かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピレーラ(100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	165 1	181.5 mg/m ² 本	○																
5	★側管点滴 (レジメン) 15:00-17:00 2時間かけて 毒 ★エルプラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	85 1	93.5 mg/m ² 本	○																
6	★側管点滴 (レジメン) 15:00-17:00 2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																
7	★持続点滴 (レジメン) 17:00-17:00 48時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:インフューサー	3200 230 mL	3520 mg/m ² 0	○																
	<<以下余白>>																			

備考 13サイクル目からは原則L-OHP及びCPT-11抜きの維持療法

