◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFOXIRI(インフューザー)+Bev(初回90分)】

レジメン番号　02260630

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFOXIRI(インフューザー)+Bev(初回90分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:00			
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保			
2	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:00-13:30　30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
3	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:30-15:00　90分かけて			
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5	mg/kg
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5	mg/kg
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
4	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 15:00-16:00　60分かけて			
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	165	181.5	mg/m²
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 16:00-18:00　2時間かけて			
	毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5	mg/m²
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
6	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 16:00-18:00　2時間かけて			
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220	mg/m²
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220	mg/m²
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
7	★持続点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 18:00-18:00　48時間かけて			
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「トーワ」(1000mg 20mL)	3200	3520	mg/m²
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	230 mL	0	
	◆施行者F：ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ			

<<以下余白>>

d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

備考	13サイクル目からは原則L-OHP及びCPT-11抜きの維持療法