◆レジメンマスタ確認シート◆

【mFOLFOX6+Bev(初回90分) 】

レジメン番号　02260253

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6+Bev(初回90分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-16:00　23時間かけて			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL)	1200	1320 mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」	1	本														
	◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで																
	<<以下余白>>																

備考									

【mFOLFOX6+Bev（初回９０分）】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号　02260253

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6+Bev(初回90分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00 ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：血管確保。	1		本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:30　90分かけて 劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL) 劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 5.5	mg/kg mg/kg 本	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:30-15:00　30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5		本 V	○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00　2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	200 200 1	220 220	mg/㎡ mg/㎡ 本	○													
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00　2時間かけて 毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	85 1	93.5	mg/㎡ 本	○													
6	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00-15:00　23時間かけて 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」 ◆施行者F：２３時間ぐらいで	1200 1	1320	mg/㎡ 本		○												
7	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：全開で。	400 1	440	mg/㎡ 本	○													

<次頁に続く>

備考	