

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 02260283

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数 14日

【 FOLFIRI+Bev(2回目以降30分) 】

Rp	薬品名	標準値	上限値	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 血管確保。	1	本	○											
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注 (400mg 16mL) 劇 アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本	○															
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 ク <sup>®</sup> ラニセトロン点滴ハック <sup>®</sup> 「HK」 (3mg/100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○															
4	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて 【レジメン】レボ <sup>®</sup> ホリナート点滴静注 (100mg) 【レジメン】レボ <sup>®</sup> ホリナート点滴静注 (25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/m <sup>2</sup> 220 mg/m <sup>2</sup> 本	○															
5	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピ <sup>®</sup> ーラ (100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	150 1	165 mg/m <sup>2</sup> 本	○															
6	★持続点滴 (レジメン) 15:00-14:00 23時間かけて 劇 フルオロウラシル注「ト <sup>®</sup> ワ」 (1000mg 20mL) 生理食塩液ハック <sup>®</sup> 【1L】「フ <sup>®</sup> ソ」 ◆施行者F: 23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m <sup>2</sup> 本	○															
7	★側管一時点滴 (レジメン) 16:00 劇 フルオロウラシル注「ト <sup>®</sup> ワ」 (1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 全開で。	400 1	440 mg/m <sup>2</sup> 本	○															
<次頁に続く>																			

備考				

### ◆レジメンマスタ確認シート◆

### 【FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号 02260283

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				8	★持続点滴 (レジメン) 16:00-15:00 23時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トローワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハック「1L」 「フソー」 ◆施行者F: 23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m <sup>2</sup> 本	○									
	<<以下余白>>																

備考		
----	--	--