◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFOXIRI+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260660

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFOXIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：血管確保	1		本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5		本 V	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:00 30分かけて 劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL) 劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg	 本	○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-15:00 60分かけて 劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	165 1	181.5 mg/㎡	 本	○													
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00 2時間かけて 毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	85 1	93.5 mg/㎡	 本	○													
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-17:00 2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/㎡ 220 mg/㎡	 本	○													
7	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-17:00 24時間かけて 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」 ◆施行者F：24時間ぐらいで	1600 1	1760 mg/㎡	 本	○													

<次頁に続く>

備考	13サイクル目からは原則L-OHP及びCPT-11抜きの維持療法

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFOXIRI+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260660

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFOXIRI+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　17:00-17:00　24時間かけて																
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL)	1600	1760 mg/㎡		○												
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」	1	本														
	◆施行者Ｆ：24時間ぐらいで																
	<<以下余白>>																

備考	13サイクル目からは原則L-OHP及びCPT-11抜きの維持療法