

◆レジメンマスター確認シート◆

【mFOLFOX6インフューサー+C-mab(初回2時間 400mg/m²)】

レジメン番号 02260353

対象がん種 大腸がん

レジメン名 mFOLFOX6インフューサー+C-mab(初回2時間 400mg/m²)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	日																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																					
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:15 15分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック(HK)(3mg/100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1.5 1	本 V A	○																					
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:15 15分かけて 生理食塩液PL「フソー」(50mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1 1	本 V A											○											
4	★側管点滴 (レジメン) 13:45-14:45 1時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 2回目~250mg/m ² 。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	250 1	275 mg/m ² 本																						
5	★側管点滴 (レジメン) 13:45-15:45 2時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 初回400mg/m ² 。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	400 1	440 mg/m ² 本	○																					
6	★側管点滴 (レジメン) 16:45-18:45 2時間かけて 【レジメン】レボホリナート点滴静注(100mg) 【レジメン】レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖【光糖液】5% (250mL) ◆施行者F: アービタックス終了後1時間してから開始。エルフラットと同時	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																					
7	★側管点滴 (レジメン) 16:45-18:45 2時間かけて 毒 ★エルフラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖【光糖液】5% (250mL) ◆施行者F: アービタックス終了後1時間してから開始。レボホリナートと同時	85 1	93.5 mg/m ² 本	○																					
	<次頁に続く>																								

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【mFOLFOX6インフェューサー+C-mab(初回2時間 400mg/m²)】

レジメン番号 02260353

対象がん種 大腸がん

レジメン名 mFOLFOX6インフェューサー+C-mab(初回2時間 400mg/m²)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																										
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
8	★側管一時点滴 (レジメン) 18:45 劇 フルオロウラシル注「トーマ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：全開	400	440 mg/m ²	○																									
9	★持続点滴 (レジメン) 18:45-16:45 46時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トーマ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F：インフェューサー	2400 92 mL	2640 mg/m ² 0	○																									
<<以下余白>>																													

備考

--