◆レジメンマスタ確認シート◆【C-mab(500mg/m2)+mFOLFOX6ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(BSA1.92㎡～)_初回12】

レジメン番号　02260438

対象がん種　大腸がん

レジメン名　C-mab(500mg/m2)+mFOLFOX6ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(BSA1.92㎡～) 初回12

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15				○													
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：血管確保。																	
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15-12:30　15分かけて				○													
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V														
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A														
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-15:00　2時間かけて				○													
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	500	550	mg/㎡														
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：500mg/m2。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。																	
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00-18:00　2時間かけて				○													
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡														
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ｴﾙﾌﾟﾗﾄと同時																	
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00-18:00　2時間かけて				○													
	毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗﾄ点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時																	
6	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 18:00				○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		本														
	◆施行者F：全開																	
7	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 18:00-16:00　46時間かけて				○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		mL														
	◆施行者F：ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ																	
	<<以下余白>>																	

備考	