

◆レジメンマスタ確認シート◆ **【C-mab(500mg/m²)+mFOLFOX6インフューサ^ン（BSA1.92m²～）...2回目】**

レジメン番号 02260448

対象がん種 大腸がん

レジメン名 C-mab(500mg/m²)+mFOLFOX6インフューサ^ン（BSA1.92m²～）2回目

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
1	★一時点滴（レジメン） 12:15 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：血管確保。	1	本	○																										
2	★側管点滴（レジメン） 12:15-12:30 15分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック（HK）（3mg/100mL） デキサート注射液（6.6mg 2mL） ポララミン注（5mg 1mL）	1 1.5 1	本 V A	○																										
3	★側管点滴（レジメン） 13:00-14:00 1時間かけて 劇 アービタックス注射液（100mg 20mL） 生理食塩液「ヒカリ」（250mL） ◆施行者F：500mg/m ² 。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	500 1	550 mg/m ² 本	○																										
4	★側管点滴（レジメン） 14:15-16:15 2時間かけて 【レジメン】レボホリナート点滴静注（100mg） 【レジメン】レボホリナート点滴静注（25mg） ブドウ糖【光糖液】5%（250mL） ◆施行者F：アービタックス終了後1時間してから開始。エルフロラットと同時	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																										
5	★側管点滴（レジメン） 14:15-16:15 2時間かけて 毒 ★エルフロラット点滴静注（100mg 20mL） ブドウ糖【光糖液】5%（250mL） ◆施行者F：アービタックス終了後1時間してから開始。レボホリナートと同時	85 1	93.5 mg/m ² 本	○																										
6	★側管一時点滴（レジメン） 16:15 劇 フルオロウラシル注「トロー」（1000mg 20mL） テルモ生食（100mL）【生理食塩液】 ◆施行者F：全開	400 1	440 mg/m ² 本	○																										
7	★持続点滴（レジメン） 16:15-14:15 46時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トロー」（1000mg 20mL） テルモ生食（100mL）【生理食塩液】 ◆施行者F：インフューサ ^ン	2400 1	2640 mg/m ² mL	○																										
			<<以下余白>>																											

備考					