◆レジメンマスタ確認シート◆

【C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 初回120分】

レジメン番号　02260455

対象がん種　大腸がん

レジメン名　C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 初回120分

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15				○													
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：血管確保																	
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15-12:30 15分かけて				○													
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V														
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A														
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-15:00 2時間かけて				○													
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	500	550	mg/㎡														
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：500mg/m2。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。																	
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00-18:00 2時間かけて				○													
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡														
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ｲﾘﾉﾃｶﾝと同時																	
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00-18:00 2時間かけて				○													
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	150	165	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時																	
6	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-16:00 23時間かけて					○												
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	1200	1320	mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】｢ﾌｿｰ｣	1		本														
	◆施行者F：２３時間ぐらいで																	
7	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 18:00				○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		本														
	◆施行者F：全開																	

<次頁に続く>

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆

【C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 初回120分】

レジメン番号　02260455

対象がん種　大腸がん

レジメン名　C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 初回120分

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 18:00-17:00　23時間かけて			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL)	1200	1320 mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸ【1L】「ﾌｿｰ」	1	本														
	◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで																
	<<以下余白>>																

備考	