

レジメンマスタ確認シート

レジメン番号 02260465

対象がん種 大腸がん

レジメン名 C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 2回目以降 60分

インターバル日数 14日

【C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 2回目以降 60分】

Rp	薬品名	標準値	上限値																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
1	★一時点滴 (レジメン) 12:15 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																																			
2	★側管点滴 (レジメン) 12:15-12:30 15分かけて 劇 ケラセトロン点滴「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注(5mg 1mL)	1 1.5 1	本 V A	○																																			
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:00 1時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:500mg/m2。0.22µmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	500 1	550 mg/m ² 本	○																																			
4	★側管点滴 (レジメン) 14:15-16:15 2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖[光糖液]5% (250mL) ◆施行者F:アービタックス終了後15分してから開始。イリノテカンと同時	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																																			
5	★側管点滴 (レジメン) 14:15-16:15 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスビエーラ(100mg 5mL) ブドウ糖[光糖液]5% (250mL) ◆施行者F:アービタックス終了後15分してから開始。レボホリナートと同時	150 1	165 mg/m ² 本	○																																			
6	★持続点滴 (レジメン) 15:15-14:15 23時間かけて 劇 フルオウラシル注「トワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液「フソー」【1L】「フソー」 ◆施行者F:23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m ² 本	○																																			
7	★側管一時点滴 (レジメン) 16:15 劇 フルオウラシル注「トワ」(1000mg 20mL) テルモ生食(100mL)【生理食塩液】 ◆施行者F:全開	400 1	440 mg/m ² 本	○																																			
<次頁に続く>																																							

備考		

レジメンマスタ確認シート

【C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 2回目以降 60分】

レジメン番号

02260465

対象がん種

大腸がん

レジメン名

C-mab(500mg/m2 biweekly)+FOLFIRI 2回目以降 60分

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴 (レジメン) 16:15-15:15 23時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ハック【1L】「フソー」 ◆施行者F: 23時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/m ² 本	○													
<<以下余白>>																	

備考	
----	--

--