◆レジメンマスタ確認シート◆ 【C-mab(500mg/m2 biweekly)+mFOLFOX6 2回目以降60分】

レジメン番号　02260446

対象がん種　大腸がん

レジメン名　C-mab(500mg/m2 biweekly)+mFOLFOX6 2回目以降60分

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：血管確保。	 1		 本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:15-12:30　15分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	 1 1.5 1		 本 V A	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:00　1時間かけて 劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者F：500mg/m2。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。	 500 1	 550 mg/㎡	 本	○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:15-16:15　2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後15分してから開始。ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄと同時	 200 200 1	 220 mg/㎡ 220 mg/㎡ 	 本	○													
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:15-16:15　2時間かけて 毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後15分してから開始。ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時	 85 1	 93.5 mg/㎡ 	 本	○													
6	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:15-14:15　23時間かけて 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」 ◆施行者F：２３時間ぐらいで	 1200 1	 1320 mg/㎡ 	 本		○												
7	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:15 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者F：全開	 400 1	 440 mg/㎡ 	 本	○													

<次頁に続く>

備考

◆レジメンマスタ確認シート◆

【C-mab(500mg/m2 biweekly)+mFOLFOX6 2回目以降60分】

レジメン番号　02260446

対象がん種　大腸がん

レジメン名　C-mab(500mg/m2 biweekly)+mFOLFOX6 2回目以降60分

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:15-15:15　23時間かけて			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL)	1200	1320 mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」	1	本														
	◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで																
	<<以下余白>>																

備考	