◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザー+P-mab】

レジメン番号　02260313

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIインフューザー+P-mab

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（レジメン）　13:00				○													
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本														
	◆施行者F：血管確保																	
2	★側管点滴（レジメン）　13:00-13:30　30分かけて				○													
	劇 グラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V														
3	★側管点滴（レジメン）　13:30-14:30　1時間かけて				○													
	劇 ベクティビックス点滴静注(100mg 5mL)	6	6.6	mg/kg														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本														
	◆施行者F：0.22μmインラインフィルター使用																	
4	★側管点滴（レジメン）　14:30-16:30　2時間かけて				○													
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg)	200	220	mg/m²														
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg)	200	220	mg/m²														
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：トポテシンと同時																	
5	★側管点滴（レジメン）　14:30-16:30　2時間かけて				○													
	劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピーラ(100mg 5mL)	150	165	mg/m²														
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：レボホリナートと同時																	
6	★側管一時点滴（レジメン）　16:30				○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440	mg/m²														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本														
	◆施行者F：全開																	
7	★持続点滴（レジメン）　16:30-14:30　46時間かけて				○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/m²														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	92 mL	0															
	◆施行者F：インフューザー																	
				<<以下余白>>														

備考	