

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRI インフューザー + RAM (初回60分)】

レジメン番号 02260586

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRI インフューザー + RAM (初回60分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保用	1	本	○																											
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:00 1時間かけて 劇 サイラムサ点滴静注液(500mg 50mL) 劇 サイラムサ点滴静注液(100mg 10mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 全量250mL フィルター使用。レスタミン前投薬	8 8 1	8.8 mg/kg 8.8 mg/kg 本	○																											
3	★側管点滴 (レジメン) 14:00-14:30 30分かけて 劇 ケーラニセトロン点滴パック「HK」(3mg/100mL) デキササート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																											
4	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖[光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F: イリノテカンと同時	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																											
5	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピナー(100mg 5mL) ブドウ糖[光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F: レボホリナートと同時	150 1	180 mg/m ² 本	○																											
6	★側管一時点滴 (レジメン) 16:30 劇 フルオロウラシル注「トロー」(1000mg 20mL) テルモ生食(100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: 全開	400 1	440 mg/m ² 本	○																											
7	★持続点滴 (レジメン) 16:30-14:30 46時間かけて 劇 フルオロウラシル注「トロー」(1000mg 20mL) テルモ生食(100mL) [生理食塩液] ◆施行者F: インフューザー	2400 92 mL	2640 mg/m ² 0	○																											
	<<以下余白>>																														

備考	レスタミン前投薬あり。
----	-------------

--	--