◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザー+RAM(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260585

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIインフューザー+RAM(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1	★一時点滴（レジメン） 13:00			○
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1	本	
	◆施行者F：血管確保用			
2	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:30　30分かけて			○
	劇 サイラムザ点滴静注液(500mg 50mL)	8	8.8 mg/kg	
	劇 サイラムザ点滴静注液(100mg 10mL)	8	8.8 mg/kg	
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1	本	
	◆施行者F：全量250mL フィルター使用。レスタミン前投薬			
3	★側管点滴（レジメン） 13:30-14:00　30分かけて			○
	劇 グラニセトロン点滴バッグ「HK」(3mg100mL)	1	本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V	
4	★側管点滴（レジメン） 14:00-16:00　2時間かけて			○
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg)	200	220 mg/m²	
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg)	200	220 mg/m²	
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本	
	◆施行者F：イリノテカンと同時			
5	★側管点滴（レジメン） 14:00-16:00　2時間かけて			○
	劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピーラ(100mg 5mL)	150	180 mg/m²	
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本	
	◆施行者F：レボホリナートと同時			
6	★側管一時点滴（レジメン） 16:00			○
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440 mg/m²	
	テルモ生食 (100mL)［生理食塩液］	1	本	
	◆施行者F：全開			
7	★持続点滴（レジメン） 16:00-14:00　46時間かけて			○
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640 mg/m²	
	テルモ生食 (100mL)［生理食塩液］	92 mL	0	
	◆施行者F：インフューザー			
			<<以下余白>>	

備考	レスタミン前投薬あり。