◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRI＋RAM（初回60分）】

レジメン番号　02260564

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRI＋RAM(初回60分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00 ﾃﾙﾓ生食（100mL）［生理食塩液］ ◆施行者Ｆ：血管確保。	1	本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00-14:00　1時間かけて 劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(500mg 50mL) 劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(100mg 10mL) 生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL) ◆施行者Ｆ：全量250mL ﾌｨﾙﾀｰ使用。ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬	8 8 1	8.8 mg/kg 8.8 mg/kg 本	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:00-14:30　30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:30-16:30　2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	200 200 1	220 mg/㎡ 220 mg/㎡ 本	○													
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:30-16:30　2時間かけて 劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	150 1	180 mg/㎡ 本	○													
6	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　15:30-14:30　23時間かけて 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」 ◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで	1200 1	1320 mg/㎡ 本		○												
7	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　16:30 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食（100mL）［生理食塩液］ ◆施行者Ｆ：全開で。	400 1	440 mg/㎡ 本	○													

<次頁に続く>

備考	ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬あり。

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRI＋RAM（初回60分）】

レジメン番号　02260564

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRI＋RAM(初回60分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　16:30-15:30　23時間かけて			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注「ﾄｰﾜ」(1000mg 20mL)	1200	1320 mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】「ﾌｿｰ」	1	本														
	◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで																
	<<以下余白>>																

備考	ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬あり。