◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRI＋RAM（2回目以降30分）】

レジメン番号　02260565

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRI＋RAM(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00			○													
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1	本														
	◆施行者Ｆ：血管確保。																
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて			○													
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液(500mg 50mL)	8	8.8 mg/kg														
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液(100mg 10mL)	8	8.8 mg/kg														
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本														
	◆施行者Ｆ：全量250mL ﾌｨﾙﾀｰ使用。ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬																
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:00 30分かけて			○													
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1	本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V														
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-16:00 2時間かけて			○													
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220 mg/㎡														
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220 mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本														
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-16:00 2時間かけて			○													
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	150	180 mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1	本														
6	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00-14:00 23時間かけて				○												
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	1200	1320 mg/㎡														
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ【1L】｢ﾌｿｰ｣	1	本														
	◆施行者Ｆ：２３時間ぐらいで																
7	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:00			○													
	劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL)	400	440 mg/㎡														
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］	1	本														
	◆施行者Ｆ：全開で。																

<次頁に続く>

備考	ﾚｽﾀﾐﾝ前投薬あり。