◆レジメンマスタ確認シート◆

【mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92㎡～)+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260513

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92㎡～)+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴(レジメン) 13:00				○													
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本														
	◆施行者F：血管確保。																	
2	★側管点滴(レジメン) 13:00-13:30	30分かけて			○													
	劇 アバスチン点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5	mg/kg														
	劇 アバスチン点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5	mg/kg														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本														
3	★側管点滴(レジメン) 13:30-14:00	30分かけて			○													
	劇 グラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg100mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V														
4	★側管点滴(レジメン) 14:00-16:00	2時間かけて			○													
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡														
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡														
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：エルプラットと同時																	
5	★側管点滴(レジメン) 14:00-16:00	2時間かけて			○													
	毒 ★エルプラット点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5	mg/㎡														
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：レボホリナートと同時																	
6	★側管一時点滴(レジメン) 16:00				○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本														
	◆施行者F：全開																	
7	★一時点滴(レジメン) 16:10				○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		mL														
	◆施行者F：インフューザーで																	
	<<以下余白>>																	

備考	