◆レジメンマスタ確認シート◆【mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92m2～) +C-mab(初回2時間 400mg/】

レジメン番号　02260751

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92m2～) +C-mab(初回2時間 400mg/

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:00				○							○						
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：血管確保																	
2	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:00-13:15 15分かけて				○													
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V														
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A														
3	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:00-13:15 15分かけて											○						
	生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ (50mL)	1		本														
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V														
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A														
4	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:45-14:45 1時間かけて											○						
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	250	275	mg/㎡														
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：2回目～250mg/㎡。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。																	
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:45-15:45 2時間かけて				○													
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	400	440	mg/㎡														
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本														
	◆施行者F：初回400mg/㎡。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。																	
6	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 16:45-18:45 2時間かけて				○													
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡														
	[ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄと同時																	
7	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 16:45-18:45 2時間かけて				○													
	毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL)	85	93.5	mg/㎡														
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本														
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始。ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄと同時																	

<次頁に続く>

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆【mFOLFOX6インフューザー（BSA1．92m2～） +C-mab（初回2時間 400mg/】

レジメン番号　02260751

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92m2～) +C-mab(初回2時間 400mg/

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
8	★側管一時点滴（レジメン） 18:45			○
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		本
	◆施行者F：全開			
9	★持続点滴（レジメン） 18:45-16:45　46時間かけて			○
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL)［生理食塩液］	1		mL
	◆施行者F：インフューザー			

<<以下余白>>

d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

備考	