◆レジメンマスタ確認シート◆【mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92m2～) +C-mab(2回目以降1時間250】

レジメン番号　02260761

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザー(BSA1.92m2～) +C-mab(2回目以降1時間250

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（レジメン） 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：血管確保。	1		本	○							○						
2	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:15　15分かけて 劇 グラニセトロン点滴バック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1.5 1		本 V A	○													
3	★側管点滴（レジメン） 13:00-13:15　15分かけて 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1 1		本 V A								○						
4	★側管点滴（レジメン） 13:45-14:45　1時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F：2回目～250mg/㎡。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	250 1	275	mg/㎡ 本	○							○						
5	★側管点滴（レジメン） 15:00-17:00　2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：アービタックス終了後15分してから開始。エルプラットと同時	200 200 1	220 220	mg/㎡ mg/㎡ 本	○													
6	★側管点滴（レジメン） 15:00-17:00　2時間かけて 毒 ★エルプラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：アービタックス終了後15分してから開始。レボホリナートと同時	85 1	93.5	mg/㎡ 本	○													
7	★側管一時点滴（レジメン） 17:00 劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者F：全開	400 1	440	mg/㎡ 本	○													

<次頁に続く>

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆【mFOLFOX6インフューザ゛ー(BSA1.92m2～) +C-mab(2回目以降1時間250】

レジメン番号　02260761

対象がん種　大腸がん

レジメン名　mFOLFOX6インフューザ゛ー(BSA1.92m2～) +C-mab(2回目以降1時間250

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	★持続点滴（レジ゛メン） 17:00-15:00　46時間かけて			○													
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640 mg/m²														
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	mL														
	◆施行者F：インフューザ゛ー																
	<<以下余白>>																

備考	