

◆レジメンマスター確認シート◆

【mFOLFOX6インフューサ<sup>®</sup> (BSA1.92m2～) +P-mab】

レジメン番号 02260741

対象がん種 大腸がん

レジメン名 mFOLFOX6インフューサ<sup>®</sup> (BSA1.92m2～) +P-mab

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	日																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																														
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 ケ <sup>®</sup> ラニセトロン点滴パ <sup>®</sup> ック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																														
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:30 1時間かけて 劇 ヘ <sup>®</sup> クティビ <sup>®</sup> ックス点滴静注(100mg 5mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:0.22μmインラインフィルター使用	6 1	6.6 mg/kg 本	○																														
4	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて [レジメン]レボ <sup>®</sup> ホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボ <sup>®</sup> ホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:エルプラットと同時	200 200 1	220 mg/m <sup>2</sup> 220 mg/m <sup>2</sup> 本	○																														
5	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて 毒 ★エルプ <sup>®</sup> ラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:レボホリナートと同時	85 1	93.5 mg/m <sup>2</sup> 本	○																														
6	★側管一時点滴 (レジメン) 16:30 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:全開	400 1	440 mg/m <sup>2</sup> 本	○																														
7	★持続点滴 (レジメン) 16:30-14:30 46時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:インフューサ <sup>®</sup>	2400 1	2640 mg/m <sup>2</sup> mL	○																														
				<<以下余白>>																														

備考					
----	--	--	--	--	--