◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザ゛ー(BSA1.92㎡～)】

レジメン番号　02260471

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ(BSA1.92㎡～)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL) ◆施行者F：血管確保	1		本	○													
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30　30分かけて 劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5		本 V	○													
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-15:30　2時間かけて [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(100mg) [ﾚｼﾞﾒﾝ]ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注(25mg) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：イリノテカンと同時	200 200 1	220 mg/㎡ 220 mg/㎡ 	 本	○													
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-15:30　2時間かけて 劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL) ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL) ◆施行者F：レボホリナートと同時	150 1	165 mg/㎡ 	 本	○													
5	★側管一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:30 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者F：全開	400 1	440 mg/㎡ 	 本	○													
6	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:40 劇 ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ注｢ﾄｰﾜ｣(1000mg 20mL) ﾃﾙﾓ生食 (100mL)［生理食塩液］ ◆施行者F：ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰ	2400 1	2640 mg/㎡ 	 mL	○													
				<<以下余白>>														

備考	