

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザー(BSA1.92㎡～)+Bev(初回90分)】

レジメン番号 02260483

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRIインフューザー(BSA1.92㎡～)+Bev(初回90分)

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保用	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-14:30 90分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	5 5 1	5.5 mg/kg 5.5 mg/kg 本	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 14:30-15:00 30分かけて 劇 グラネセトロン点滴ハック [®] 「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 15:00-17:00 2時間かけて [レジメン]レボ [®] ホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボ [®] ホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:イリノテカンと同時	200 200 1	220 mg/㎡ 220 mg/㎡ 本	○																				
5	★側管点滴 (レジメン) 15:00-17:00 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスビ [®] ーラ(100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:レボホリナートと同時	150 1	165 mg/㎡ 本	○																				
6	★側管一時点滴 (レジメン) 17:00 劇 フロロウラシル注「トーラ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:全開	400 1	440 mg/㎡ 本	○																				
7	★一時点滴 (レジメン) 17:10 劇 フロロウラシル注「トーラ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:インフューザー	2400 1	2640 mg/㎡ mL	○																				
	<<以下余白>>																							

備考					