◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューサ゛ー(BSA1.92㎡～)+Bev(2回目以降30分)】

レジメン番号　02260493

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIインフューサ゛ー(BSA1.92㎡～)+Bev(2回目以降30分)

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（レシ゛メン） 13:00			
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保用			
2	★側管点滴（レシ゛メン） 13:00-13:30　30分かけて			
	劇 アバ゛スチン点滴静注(400mg 16mL)	5	5.5	mg/kg
	劇 アバ゛スチン点滴静注(100mg 4mL)	5	5.5	mg/kg
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
3	★側管点滴（レシ゛メン） 13:30-14:00　30分かけて			
	劇 グ゛ラニセトロン点滴ハ゛ック゛「HK」(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
4	★側管点滴（レシ゛メン） 14:00-16:00　2時間かけて			
	[レシ゛メン]レホ゛ホリナート点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡
	[レシ゛メン]レホ゛ホリナート点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：イリノテカンと同時			
5	★側管点滴（レシ゛メン） 14:00-16:00　2時間かけて			
	劇 イリノテカン塩酸塩注ホスヒ゜ーラ(100mg 5mL)	150	165	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：レボホリナートと同時			
6	★側管一時点滴（レシ゛メン） 16:00			
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：全開			
7	★一時点滴（レシ゛メン） 16:10			
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		mL
	◆施行者F：インフューサ゛ー			

<<以下余白>>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	○													
2	○													
3	○													
4	○													
5	○													
6	○													
7	○													

備考	