

◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザー (BSA1.92m2〜)+P-mab】

レジメン番号 02260721

対象がん種 大腸がん

レジメン名 FOLFIRIインフューザー (BSA1.92m2〜)+P-mab

インターバル日数 14日

Rp	薬品名	標準値	上限値																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																						
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴パック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V	○																						
3	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:30 1時間かけて 劇 ヘクテイビックス点滴静注(100mg 5mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:0.22μmインラインフィルター使用	6 1	6.6 mg/kg 本	○																						
4	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて [レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg) [レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:イリノテカンと同時	200 200 1	220 mg/m ² 220 mg/m ² 本	○																						
5	★側管点滴 (レジメン) 14:30-16:30 2時間かけて 劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピール(100mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL) ◆施行者F:レボホリナートと同時	150 1	165 mg/m ² 本	○																						
6	★側管一時点滴 (レジメン) 16:30 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:全開	400 1	440 mg/m ² 本	○																						
7	★持続点滴 (レジメン) 16:30-14:30 46時間かけて 劇 フルオウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:インフューザー	2400 1	2640 mg/m ² mL	○																						
			<<以下余白>>																							

備考				