◆レジメンマスタ確認シート◆

【FOLFIRIインフューザー(BSA1.92㎡～)+AFL】

レジメン番号　02260790

対象がん種　大腸がん

レジメン名　FOLFIRIインフューザー(BSA1.92㎡～)+AFL

インターバル日数　14日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（レジメン） 13:00			
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保。			
2	★側管点滴（レジメン） 13:00-14:00　1時間かけて			
	劇 限）サルトラップ点滴静注(200mg8mL)	4	4.4	mg/kg
	劇 限）サルトラップ点滴静注(100mg4mL)	4	4.4	mg/kg
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：0.22μmフィルター使用。			
3	★側管点滴（レジメン） 14:00-14:30　30分かけて			
	劇 グラニセトロン点滴バッグ「HK」(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
4	★側管点滴（レジメン） 14:30-16:30　2時間かけて			
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(100mg)	200	220	mg/㎡
	[レジメン]レボホリナート点滴静注(25mg)	200	220	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：イリノテカンと同時			
5	★側管点滴（レジメン） 14:30-16:30　2時間かけて			
	劇 イリノテカン塩酸塩注ホスピーラ(100mg 5mL)	150	180	mg/㎡
	ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	1		本
	◆施行者F：レボホリナートと同時			
6	★側管一時点滴（レジメン） 16:30			
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：全開			
7	★持続点滴（レジメン） 16:30-14:30　46時間かけて			
	劇 フルオロウラシル注「トーワ」(1000mg 20mL)	2400	2640	mg/㎡
	テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		mL
	◆施行者F：インフューザー			

<<以下余白>>

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	○													
2	○													
3	○													
4	○													
5	○													
6	○													
7	○													

備考