◆レジメンマスタ確認シート◆

【CPT－11（A）+C－mab（初回2時間　400mg/m2）】

レジメン番号　02260183

対象がん種　大腸がん

レジメン名　CPT-11(A)+C-mab(初回2時間 400mg/m2)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00			
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：血管確保用、すべて終了後抜針			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:15　15分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:15　15分かけて			
	生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ (50mL)	1		本
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:45-14:45　1時間かけて			
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	250	275	mg/㎡
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：2回目～250mg/㎡。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。			
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:45-15:45　2時間かけて			
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	400	440	mg/㎡
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：初回400mg/㎡。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。			
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:00			
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	100	110	mg/㎡
	ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］ 5% (500mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後15分してから開始			
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:45			
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	100	110	mg/㎡
	ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］ 5% (500mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後1時間してから開始			
	<<以下余白>>			

d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
○							○							○							○						
○							○							○													
																					○						
							○							○							○						
○																											
							○							○													
○																											

備考	