

◆レジメンマスタ確認シート◆

【XELOX+C-mab (初回2時間 400mg/m²)】

レジメン番号 02260373

対象がん種 大腸がん

レジメン名 XELOX+C-mab(初回2時間 400mg/m²)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	d2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:15 15分かけて 劇 タラニセトロン点滴ハック「HK」(3mg 100mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1.5 1	本 V A	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:15 15分かけて 生理食塩液PL「フソー」 (50mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL) ポララミン注 (5mg 1mL)	1 1 1	本 V A								○													
4	★側管点滴 (レジメン) 13:45-14:45 1時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 2回目~250mg/m ² 。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	250 1	275 mg/m ² 本									○												
5	★側管点滴 (レジメン) 13:45-15:45 2時間かけて 劇 アービタックス注射液(100mg 20mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 初回400mg/m ² 。0.22μmフィルター使用。前投薬終了30分後に開始。	400 1	440 mg/m ² 本	○																				
6	★側管点滴 (レジメン) 16:45-18:45 2時間かけて 毒 ★エルプラット点滴静注(100mg 20mL) ブドウ糖「光糖液」5% (250mL) ◆施行者F: アービタックス終了後1時間してから開始。	130 1	143 mg/m ² 本	○																				
	<<以下余白>>																							

備考	ゼロダ850mg/m ² /回を1日2回(d1夕~d15朝)
----	---

