◆レジメンマスタ確認シート◆

【XELOX+C−mab(2回目以降1時間　250mg/m2)】

レジメン番号　02260383

対象がん種　大腸がん

レジメン名　XELOX+C-mab(2回目以降1時間　250mg/m2)

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ)　13:00				○							○							○						
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本																					
	◆施行者F：血管確保。																								
2	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ)　13:00-13:15　15分かけて				○																				
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V																					
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A																					
3	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ)　13:00-13:15　15分かけて											○							○						
	生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣ (50mL)	1		本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V																					
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A																					
4	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ)　13:45-14:45　1時間かけて				○							○							○						
	劇 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液(100mg 20mL)	250	275	mg/㎡																					
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本																					
	◆施行者F：2回目～250mg/㎡。0.22μmﾌｨﾙﾀｰ使用。前投薬終了30分後に開始。																								
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ)　15:00-17:00　2時間かけて				○																				
	毒 ★ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注(100mg 20mL)	130	143	mg/㎡																					
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本																					
	◆施行者F：ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ終了後15分してから開始。																								

<<以下余白>>

備考	ゼローダ850mg/㎡/回を1日2回(d1夕～d15朝)