◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+nab-PTX+Pemb】

レジメン番号　25020560

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　CBDCA+nab-PTX+Pemb

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00				○							○							○						
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本																					
	◆施行者Ｆ：血管確保																								
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて				○																				
	劇 ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ点滴静注(100mg 4mL)	200		200 mg																					
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本																					
	◆施行者Ｆ：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用																								
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:00-11:30　30分かけて											○							○						
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1		V																					
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30-12:00　30分かけて				○																				
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1		本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V																					
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30-12:00　30分かけて											○							○						
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100		110 mg/㎡																					
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	1		本																					
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。																								
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-12:30　30分かけて				○																				
	毒 必)★ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ点滴静注用100mg	100		110 mg/㎡																					
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	1		本																					
	◆施行者Ｆ：ﾌｨﾙﾀｰ【不可】1Vを生食20mLで溶解。必要量を空バッグに戻す。																								
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:30-13:30　1時間かけて				○																				
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	0		900 mg																					
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)			900 mg																					
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1		本																					
	<<以下余白>>																								

備考	