◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+PTX+BEV+Atezo(初回)】

レジメン番号　25020520

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　CBDCA+PTX+BEV+Atezo(初回)

インターバル日数　21日

Rp	薬品名		標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-12:00	1時間かけて			○																				
	劇 ﾃｾﾝﾄﾘｸ点滴静注(1200mg 20mL)		1200	1200 mg																					
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)		1	本																					
	◆施行者F：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用																								
2	★持続点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-18:00	7時間かけて			○																				
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)		1	本																					
	◆施行者F：血管確保																								
3	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:00-13:30	90分かけて			○																				
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)		15	16.5 mg/kg																					
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)		15	16.5 mg/kg																					
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1	本																					
4	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 13:30-14:00	30分かけて			○																				
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1	本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		3	V																					
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)｢日新｣		1	A																					
5	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 14:00-14:30	30分かけて			○																				
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)		1	本																					
	◆施行者F：開始と同時にﾚｽﾀﾐﾝ5Tを内服																								
6	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 14:30-17:30	3時間かけて			○																				
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢NK｣(30mg 5mL)		175	192.5 mg/㎡																					
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		1	本																					
	◆施行者F：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。																								
7	★側管点滴(ﾚｼﾞﾒﾝ) 17:30-18:30	1時間かけて			○																				
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)		0	6.6 AUC																					
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)			6.6 AUC																					
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)		1	本																					
				<<以下余白>>																					

備考	