

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PEM+CBDCA+BV (初回)】

レジメン番号 25020170

対象がん種 非小細胞肺癌

レジメン名 PEM+CBDCA+BV (初回)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:30 90分かけて																								
	劇 アハ [®] スチン点滴静注 (400mg 16mL)	15	16.5 mg/kg																						
	劇 アハ [®] スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 1	16.5 mg/kg 本																						
2	★持続点滴 (レジメン) 11:00-14:30 210分かけて 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本																						
3	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて																								
	劇 ク [®] ラニセトロン点滴ハ [®] ック「HK」(3mg100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1.5	本 V																						
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:10 10分かけて																								
	劇 アリムタ注射用 (500mg)	500	550 mg/m ²																						
	劇 アリムタ注射用 (100mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	500 1	550 mg/m ² 本																						
5	★側管点滴 (レジメン) 13:10-14:10 1時間かけて																								
	毒 ★カルホ [®] フ [®] ラチン静注液 (150mg 15mL)	0	6.6 AUC																						
	毒 ★カルホ [®] フ [®] ラチン点滴静注 (50mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	0 1	6.6 AUC 本																						
<<以下余白>>																									

備考	
----	--

