

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX+CBDCA+BV(初回)】

レジメン番号 25020240

対象がん種 非小細胞肺がん

レジメン名 PTX+CBDCA+BV(初回)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:30 90分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																				
2	★持続点滴 (レジメン) 11:00-18:00 7時間かけて 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保	1	本	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサート注射液(6.6mg 2mL) ファモチジン静注(20mg 20mL)「日新」	1 3 1	本 V Λ	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 ク [®] ラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] 「HK」(3mg100mL) ◆施行者F: 開始と同時にレスタミン5Tを内服	1	本	○																				
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-16:30 3時間かけて 毒 ★ハ [®] クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液ハ [®] ック [®] (500mL) ◆施行者F: ファモチジン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	200 1	220 mg/m ² 本	○																				
6	★側管点滴 (レジメン) 16:30-17:30 1時間かけて 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [テルモ糖注] 5% (500mL)	0 1	6.6 AUC 6.6 AUC 本	○																				
<<以下余白>>																								

備考