

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX+CBDCA+BV(2回目)】

レジメン番号 25020250

対象がん種 非小細胞肺がん

レジメン名 PTX+CBDCA+BV(2回目)

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d																						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	★側管点滴 (レジメン) 11:00-12:00 1時間かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																						
2	★持続点滴 (レジメン) 11:00-17:30 390分かけて 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保	1	本	○																						
3	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサート注射液(6.6mg 2mL) ファミチン [®] 静注(20mg 20mL)「日新」	1 3 1	本 V A	○																						
4	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハック [®] 「HK」(3mg100mL) ◆施行者F:開始と同時にレスタミン5Tを内服	1	本	○																						
5	★側管点滴 (レジメン) 13:00-16:00 3時間かけて 毒 ★ハ [®] クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液ハック [®] (500mL) ◆施行者F:ファミチン [®] 、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	200 1	220 mg/m ² 本	○																						
6	★側管点滴 (レジメン) 16:00-17:00 1時間かけて 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [テルモ糖注] 5% (500mL)	0 1	6.6 AUC 6.6 AUC 本	○																						
			<<以下余白>>																							

備考

