◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX+CBDCA+BV(3回目以降)】

レジメン番号　25020260

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　PTX+CBDCA+BV(3回目以降)

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-11:30 30分かけて			○																				
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5 mg/kg																					
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5 mg/kg																					
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																					
2	★持続点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:00-17:00 6時間かけて			○																				
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1	本																					
	◆施行者F：血管確保																							
3	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 11:30-12:00 30分かけて			○																				
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																					
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	3	V																					
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」	1	A																					
4	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:00-12:30 30分かけて			○																				
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)	1	本																					
	◆施行者F：開始と同時にﾚｽﾀﾐﾝ5Tを内服																							
5	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 12:30-15:30 3時間かけて			○																				
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL)	200	220 mg/㎡																					
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ (500mL)	1	本																					
	◆施行者F：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。																							
6	★側管点滴 (ﾚｼﾞﾒﾝ) 15:30-16:30 1時間かけて			○																				
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	0	6.6 AUC																					
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		6.6 AUC																					
	ブドウ糖 [ﾃﾙﾓ糖注] 5% (500mL)	1	本																					
	<<以下余白>>																							

備考	