◆レジメンマスタ確認シート◆ 【Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM】

レジメン番号　25020720

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM

インターバル日数　42日

Rp	薬品名	標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			○																					○						
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)	1	本																												
	◆施行者Ｆ：血管確保																														
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30 30分かけて			○																					○						
	劇 必）オプジーボ点滴(240mg 24mL)	240	240 mg																												
	劇 オプジーボ点滴静注(120mg 12mL)	120	120 mg																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
	◆施行者Ｆ：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用																														
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00 30分かけて																								○						
	ｱﾛｷｼ静注(0.75mg 5mL)	1	V																												
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5	V																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:10 10分かけて																								○						
	劇 アリムタ注射用(500mg)	500	550 mg/㎡																												
	劇 アリムタ注射用(100mg)	500	550 mg/㎡																												
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本																												
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:30 30分かけて			○																											
	劇 必）ヤーボイ点滴静注液(50mg 10mL)	1	1.1 mg/kg																												
	生理食塩液PL「フソー」 (50mL)	20	mL																												
	◆施行者Ｆ：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用、オプジーボ投与終了から30分以上																														
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:10-13:10 1時間かけて																								○						
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	8	mL																												
	ソルデム３輸液(500mL)	500	mL																												
	◆施行者Ｆ： 硫酸Mg 8mEq (8mL)投与																														

<次頁に続く>

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆

【Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM】

レジメン番号　25020720

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM

インターバル日数　42日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00			
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)	1		本
	◆施行者F：血管確保			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30　30分かけて			
	劇 必）オプジーボ点滴(240mg 24mL)	240	240	mg
	劇 オプジーボ点滴静注(120mg 12mL)	120	120	mg
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	◆施行者F：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用			
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00　30分かけて			
	ｱﾛｷｼ静注(0.75mg 5mL)	1		V
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:10　10分かけて			
	劇 アリムタ注射用(500mg)	500	550	mg/㎡
	劇 アリムタ注射用(100mg)	500	550	mg/㎡
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:30　30分かけて			
	劇 必）ヤーボイ点滴静注液(50mg 10mL)	1	1.1	mg/kg
	生理食塩液PL「ﾌｿｰ」 (50mL)	20		mL
	◆施行者F：0.22μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ使用、オプジーボ投与終了から30分以上			
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:10-13:10　1時間かけて			
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	8		mL
	ソルデム3輸液(500mL)	500		mL
	◆施行者F： 硫酸Mg 8mEq (8mL)投与			

<次頁に続く>

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆

【Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM】

レジメン番号　25020720

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM

インターバル日数　42日

Rp	薬品名		標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00	30分かけて				○																										
	ｱﾛｷｼ静注(0.75mg 5mL)		1		V																											
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1.5		V																											
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本																											
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:10	10分かけて				○																										
	劇 アリムタ注射用(500mg)		500	550	mg/㎡																											
	劇 アリムタ注射用(100mg)		500	550	mg/㎡																											
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本																											
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:10-13:40	30分かけて																								○						
	マンニットールS注射液(300mL)		1		本																											
10	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:10-14:10	1時間かけて				○																										
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)		8		mL																											
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL																											
	◆施行者F： 硫酸Mg 8mEq (8mL)投与																															
11	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:40-14:40	1時間かけて																								○						
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL		75	82.5	mg/㎡																											
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		200		mL																											
12	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:10-14:40	30分かけて				○																										
	マンニットールS注射液(300mL)		1		本																											
13	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:40-15:40	1時間かけて				○																										
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL		75	82.5	mg/㎡																											
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		200		mL																											
14	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:40-15:40	1時間かけて																								○						
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL																											
15	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:40-16:40	1時間かけて				○																										
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL																											
	<<以下余白>>																															

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆ 【Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM】

レジメン番号　25020720

対象がん種　非小細胞肺がん

レジメン名　Nivolumab+Ipilumumab+CDDP(点滴SH)+PEM

インターバル日数　42日

Rp	薬品名		標準値	上限値		29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00	30分かけて				
	ｱﾛｷｼ静注(0.75mg 5mL)		1		V	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1.5		V	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本	
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:10	10分かけて				
	劇 アリムタ注射用(500mg)		500	550	mg/m²	
	劇 アリムタ注射用(100mg)		500	550	mg/m²	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本	
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:10-13:40	30分かけて				
	マンニットールS注射液(300mL)		1		本	
10	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:10-14:10	1時間かけて				
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)		8		mL	
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL	
	◆施行者F： 硫酸Mg 8mEq (8mL)投与					
11	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:40-14:40	1時間かけて				
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL		75	82.5	mg/m²	
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		200		mL	
12	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:10-14:40	30分かけて				
	マンニットールS注射液(300mL)		1		本	
13	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:40-15:40	1時間かけて				
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL		75	82.5	mg/m²	
	生理食塩液「ﾋｶﾘ」(250mL)		200		mL	
14	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:40-15:40	1時間かけて				
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL	
15	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 15:40-16:40	1時間かけて				
	ソルデム3輸液(500mL)		500		mL	
	<<以下余白>>					

備考	