

◆レジメンマスタ確認シート◆

【PTX6連投】

レジメン番号 08300120

対象がん種 血管肉腫

レジメン名 PTX6連投

インターバル日数 49日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: 血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本	○																											
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F: 開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 1	本 A V	○																											
3	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハ・クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F: ファモチジン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	100 1	110 mg/m ² 本	○																											
<<以下余白>>																															

備考

【PTX6連投】

◆レジメンマスタ確認シート◆

レジメン番号 08300120

対象がん種 血管肉腫

レジメン名 PTX6連投

インターバル日数 49日

Rp	薬品名	標準値	上限値																				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	★一時点滴 (レジメン) 13:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保。側管終了後抜針・終了。	1	本	○																			
2	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン静注(20mg 20mL)「日新」 デキサート注射液(6.6mg 2mL) ◆施行者F:開始時レスタミン5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可	1 1 1	本 A V	○																			
3	★側管点滴 (レジメン) 14:00-15:00 1時間かけて 毒 ★ハ・クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:ファモチジン、DEX終了後30分で開始。フィルター使用。	100 1	110 mg/m ² 本	○																			
<<以下余白>>																							

備考	
----	--

