◆レジメンマスタ確認シート◆

【GC＋PTX】

レジメン番号　09310090

対象がん種　尿路上皮がん

レジメン名　GC＋PTX

インターバル日数　21日

Rp	薬品名		標準値	上限値		d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 00:00-05:00	5時間かけて				○
	ソルデム３輸液(500mL)		1		本	
2	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 05:00-10:00	5時間かけて				○
	ソルデム３輸液(500mL)		1		本	
3	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00-12:00	2時間かけて				○ ○
	ソルアセトＦ輸液(500mL)		1		本	
4	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 10:00-15:00	5時間かけて				○
	ソルアセトＦ輸液(500mL)		1		本	
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30	30分かけて				○
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1.5		V	
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」		1		A	
	◆施行者Ｆ：開始時ﾚｽﾀﾐﾝ５Ｔ内服					
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:00-11:30	30分かけて				○
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1		V	
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)「日新」		1		A	
	◆施行者Ｆ：開始時ﾚｽﾀﾐﾝ５Ｔ内服					
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00	30分かけて				○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)		1		本	
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 11:30-12:00	30分かけて				○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ「HK」(3mg100mL)		1		本	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)		1		V	

<次頁に続く>

備考	

◆レジメンマスタ確認シート◆

【GC＋PTX】

レジメン番号　09310090

対象がん種　尿路上皮がん

レジメン名　GC＋PTX

インターバル日数　21日

Rp	薬品名		標準値	上限値	d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-13:00	1時間かけて			○							○													
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注「NK」(30mg 5mL)		80	88 mg/㎡																					
	生理食塩液「ヒカリ」(250mL)		1	本																					
	◆施行者Ｆ：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。																								
10	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-14:00	2時間かけて			○							○													
	ソルデム３輸液(500mL)		1	本																					
11	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　13:00-15:00	2時間かけて			○																				
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL		70	77 mg/㎡																					
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)		400	mL																					
12	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:00-19:00	5時間かけて			○							○													
	ソルデム３輸液(500mL)		1	本																					
13	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　15:00-15:30	30分かけて			○							○													
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ヤクルト」【1g】		1000	1100 mg/㎡																					
	劇 ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ静注「ヤクルト」(200mg)		1000	1100 mg/㎡																					
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]		1	本																					
14	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　15:00-20:00	5時間かけて				○																			
	ソルデム３輸液(500mL)		1	本																					
15	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　15:30-17:30	2時間かけて			○	○																			
	マンニットールＳ注射液(300mL)		1	本																					
16	★持続点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　19:00-00:00	5時間かけて			○																				
	ソルデム３輸液(500mL)		1	本																					
				<<以下余白>>																					

備考	