◆レジメンマスタ確認シート◆

【CPT−11+シス　（CPT−11+CDDP）】

レジメン番号　05140230

対象がん種　婦人科がん

レジメン名　CPT-11+シス　(CPT-11+CDDP)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　09:30				○							○							○												
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本																											
	◆施行者Ｆ：血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。																														
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　09:30-11:30　2時間かけて				○							○							○												
	ソルデム３輸液(500mL)	1		本																											
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　11:30-12:00　30分かけて				○							○							○												
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本																											
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1.5		V																											
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　12:00-14:00　2時間かけて				○							○							○												
	劇 ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注ﾎｽﾋﾟｰﾗ(100mg 5mL)	60		66 mg/㎡																											
	ブドウ糖［ﾃﾙﾓ糖注］ 5% (500mL)	1		本																											
5	★側管注射（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:00				○																										
	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液 (20mg 2mL)	1		A																											
	◆施行者Ｆ：ｲﾘﾉﾃｶﾝ終了後シスプラチン開始前に静注																														
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　14:00-16:00　2時間かけて				○																										
	毒 ★ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注日医工10mg20mL	60		66 mg/㎡																											
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	400		mL																											
7	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　16:00-18:00　2時間かけて				○																										
	ソルデム３輸液(500mL)	1		本																											
8	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　18:00-20:00　2時間かけて				○																										
	ソルデム３輸液(500mL)	1		本																											
9	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ）　20:00-21:00　1時間かけて				○																										
	マンニットールＳ注射液(300mL)	1		本																											
	<<以下余白>>																														

備考	