

◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC (PTX+CBDCA) +アハ<sup>メ</sup> スチン初回 90分】

レジメン番号 05142072

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 TC (PTX+CBDCA) +アハ<sup>メ</sup> スチン初回 90分

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	★一時点滴 (レジメン) 11:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。	1	本	○																				
2	★側管点滴 (レジメン) 11:00-11:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン静注 (20mg 20mL) 「日新」 ポララミン注 (5mg 1mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 1 1 3	本 A A V	○																				
3	★側管点滴 (レジメン) 11:30-12:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴パック「HK」(3mg/100mL)	1	本	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:30 90分かけて 劇 アハ <sup>メ</sup> スチン点滴静注 (400mg 16mL) 劇 アハ <sup>メ</sup> スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																				
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-16:30 3時間かけて 毒 ★ハ <sup>メ</sup> クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「パック」(500mL) ◆施行者F:ファモチジン、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。フィルター使用	175 1	192.5 mg/m <sup>2</sup> 本	○																				
6	★側管点滴 (レジメン) 16:30-17:30 1時間かけて 毒 ★カルホ <sup>メ</sup> フ <sup>メ</sup> ラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルホ <sup>メ</sup> フ <sup>メ</sup> ラチン点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	5 1	5.5 AUC 5.5 AUC 本	○																				
			<<以下余白>>																					

備考	
----	--




--