

◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC (PTX+CBDCA)+アハ スチン2回目 60分】

レジメン番号 05142082

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 TC (PTX+CBDCA)+アハ スチン2回目 60分

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
1	★一時点滴 (レジメン) 12:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者F:血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。	1	本	○																																							
2	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:00 1時間かけて 劇 アハ スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																																							
3	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファモチジン 静注(20mg 20mL)「日新」 ポララミン注 (5mg 1mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1 1 3	本 A A V	○																																							
4	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴パック「HK」(3mg/100mL)	1	本	○																																							
5	★側管点滴 (レジメン) 14:00-17:00 3時間かけて 毒 ★ハ クリタキセル注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液パック (500mL) ◆施行者F:ファモチジン、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。フィルター使用	175 1	192.5 mg/m ² 本	○																																							
6	★側管点滴 (レジメン) 17:00-18:00 1時間かけて 毒 ★カルボ プラチン静注液 (150mg 15mL) 毒 ★カルボ プラチン点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	5 1	5.5 AUC 5.5 AUC 本	○																																							
				<<以下余白>>																																							

備考				