◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC （PTX+CBDCA）+ｱﾊﾞｽﾁﾝ3回目以降 30分】

レジメン番号　05142092

対象がん種　婦人科がん

レジメン名　TC （PTX+CBDCA）+ｱﾊﾞｽﾁﾝ3回目以降 30分

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値		d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00				○
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本	
	◆施行者F：血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。				
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-12:30 30分かけて				○
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5	mg/kg	
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5	mg/kg	
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本	
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00 30分かけて				○
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本	
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)｢日新｣	1		A	
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A	
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	3		V	
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて				○
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本	
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-16:30 3時間かけて				○
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢NK｣(30mg 5mL)	175	192.5	mg/㎡	
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1		本	
	◆施行者F：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。ﾌｨﾙﾀｰ使用				
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 16:30-17:30 1時間かけて				○
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	5	5.5	AUC	
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		5.5	AUC	
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本	
	<<以下余白>>				

備考	