

◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+GEM+アハ[®]スチン3回目以降 30分】

レジメン番号 05142341

対象がん種 再発卵巣がん

レジメン名 CBDCA+GEM+アハ[®]スチン3回目以降 30分

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	★一時点滴 (レジメン) 12:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保	1	本	○																				
2	★一時点滴 (レジメン) 12:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:血管確保	1	本																					
3	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて 劇 アハ [®] スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ [®] スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																				
4	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] 「HK」(3mg100mL)	1	本																					
5	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] デキサ [®] ート注射液(6.6mg 2mL)	1 3	本 V	○																				
6	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて 劇 ケムシタビ [®] ン静注「ヤクルト」【1g】 劇 ケムシタビ [®] ン静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000 1000 1	1100 mg/m ² 1100 mg/m ² 本																					
7	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴ハ [®] ック [®] 「HK」(3mg100mL)	1	本	○																				
8	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:30 1時間かけて 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルボ [®] フ [®] ラチン点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	4 1	4.4 AUC 4.4 AUC 本	○																				
<次頁に続く>																								

備考	
----	--

--

◆レジメンマスタ確認シート◆

【CBDCA+GEM+アハ^レスチン3回目以降 30分】

レジメン番号 05142341

対象がん種 再発卵巣がん

レジメン名 CBDCA+GEM+アハ^レスチン3回目以降 30分

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																					
				d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	★側管点滴 (レジメン) 14:30-15:00 30分かけて 劇 ケ ^ム シタビ ^ン 静注「ヤクルト」【1g】 劇 ケ ^ム シタビ ^ン 静注「ヤクルト」(200mg) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	1000	1100 mg/m ²	○																				
		1000	1100 mg/m ²																					
		1	本																					
			<<以下余白>>																					

備考

--