

レジメン番号 05142361

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 ドキシル+アハ<sup>®</sup> スチン2回目 60分

インターバル日数 28日

Rp	薬品名	標準値	上限値																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	★一時点滴 (レジメン) 12:00 ブドウ糖 [テルモ糖注] 5% (100mL) ◆施行者F:血管確保。20mL/h。ドキシル終了時にフラッシュ。	1	本	○																											
2	★一時点滴 (レジメン) 12:00 テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ◆施行者F:アハ <sup>®</sup> スチン前後フラッシュ用	1	本	○																											
3	★側管点滴 (レジメン) 12:00-13:00 1時間かけて 劇 アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注 (400mg 16mL) 劇 アハ <sup>®</sup> スチン点滴静注 (100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																											
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて ブドウ糖 [テルモ糖注] 5% (100mL) デキサート注射液 (6.6mg 2mL)	1 2	本 V	○																											
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-14:00 30分かけて 劇 ケ <sup>®</sup> ラニセトロン点滴ハ <sup>®</sup> ック <sup>®</sup> 「HK」 (3mg100mL)	1	本	○																											
6	★側管点滴 (レジメン) 14:00-16:00 2時間かけて 劇 ドキシル注 (20mg 10mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	40 1	44 mg/m <sup>2</sup> 本	○																											
<<以下余白>>																															

備考
----




--