◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC （PTX+CBDCA）+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目 60分】

レジメン番号　05142082

対象がん種　婦人科がん

レジメン名　TC (PTX+CBDCA)+ｱﾊﾞｽﾁﾝ2回目 60分

インターバル日数　21日

Rp	薬品名	標準値	上限値	
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00			
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。			
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:00-13:00 1時間かけて			
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(400mg 16mL)	15	16.5	mg/kg
	劇 ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注(100mg 4mL)	15	16.5	mg/kg
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-13:30 30分かけて			
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1		本
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)｢日新｣	1		A
	ポララミン注 (5mg 1mL)	1		A
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	3		V
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:00 30分かけて			
	劇 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴ﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣(3mg100mL)	1		本
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-17:00 3時間かけて			
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢NK｣(30mg 5mL)	175	192.5	mg/m²
	生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ(500mL)	1		本
	◆施行者Ｆ：ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。ﾌｨﾙﾀｰ使用			
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 17:00-18:00 1時間かけて			
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ静注液(150mg 15mL)	5	5.5	AUC
	毒 ★ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注(50mg 5mL)		5.5	AUC
	ブドウ糖［光糖液］ 5% (250mL)	1		本

<<以下余白>>

d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

備考	