

◆レジメンマスタ確認シート◆

【TC (PTX+CBDCA)+アハ^ホスチン3回目以降 30分】

レジメン番号 05142092

対象がん種 婦人科がん

レジメン名 TC (PTX+CBDCA)+アハ^ホスチン3回目以降 30分

インターバル日数 21日

Rp	薬品名	標準値	上限値																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	★一時点滴 (レジメン) 12:00 生理食塩液「ヒカリ」(250mL) ◆施行者 F : 血管確保。側管終了後ルート洗浄し抜針。	1	本	○																								
2	★側管点滴 (レジメン) 12:00-12:30 30分かけて 劇 アハ ^ホ スチン点滴静注(400mg 16mL) 劇 アハ ^ホ スチン点滴静注(100mg 4mL) テルモ生食 (100mL) [生理食塩液]	15 15 1	16.5 mg/kg 16.5 mg/kg 本	○																								
3	★側管点滴 (レジメン) 12:30-13:00 30分かけて テルモ生食 (100mL) [生理食塩液] ファミチジン ^ホ 静注(20mg 20mL)「日新」 ポブラミン ^ホ 注 (5mg 1mL) デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1 1 1 3	本 A A V	○																								
4	★側管点滴 (レジメン) 13:00-13:30 30分かけて 劇 クラニセトロン点滴「HK」(3mg100mL)	1	本	○																								
5	★側管点滴 (レジメン) 13:30-16:30 3時間かけて 毒 ★ハ ^ホ クリタキセル ^ホ 注「NK」(30mg 5mL) 生理食塩液「ホ」(500mL) ◆施行者 F : ファモチジン、DEX終了後30分で開始。始め15分はゆっくり。フィルター使用	175 1	192.5 mg/m ² 本	○																								
6	★側管点滴 (レジメン) 16:30-17:30 1時間かけて 毒 ★カルホ ^ホ フ ^ホ ラチン ^ホ 静注液(150mg 15mL) 毒 ★カルホ ^ホ フ ^ホ ラチン ^ホ 点滴静注(50mg 5mL) ブドウ糖 [光糖液] 5% (250mL)	5 1	5.5 AUC 5.5 AUC 本	○																								
<<以下余白>>																												

備考	
----	--

--