◆レジメンマスタ確認シート◆

【RAM+PTX （初回）】

レジメン番号　26230195

対象がん種　胃がん

レジメン名　RAM+PTX (初回)

インターバル日数　28日

Rp	薬品名	標準値	上限値
1	★一時点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30		
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本
	◆施行者F：血管確保。		
2	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 12:30-13:00　30分かけて		
	ﾃﾙﾓ生食 (100mL) [生理食塩液]	1	本
	ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注(20mg 20mL)｢日新｣	1	A
	デキサート注射液(6.6mg 2mL)	1	V
	◆施行者F：開始時ﾚｽﾀﾐﾝ5錠。初回問題なければ2回目よりDex0.5Vまで漸減可		
3	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-14:00　1時間かけて		
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(500mg 50mL)	8	8.8 mg/kg
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(100mg 10mL)	8	8.8 mg/kg
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本
	◆施行者F：全量250mL ﾌｨﾙﾀｰ使用。調製後室温、4時間以内に使用。		
4	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:00-19:00　30時間かけて		
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(500mg 50mL)	8	8.8 mg/kg
	劇 ｻｲﾗﾑｻﾞ点滴静注液(100mg 10mL)	8	8.8 mg/kg
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本
	◆施行者F：初回問題なければ2回目以降30分で。全量250mL ﾌｨﾙﾀｰ使用。		
5	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 13:30-14:30　1時間かけて		
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢NK｣(30mg 5mL)	80	88 mg/㎡
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本
	◆施行者F：前投薬終了後30分で開始。ﾌｨﾙﾀｰ使用。		
6	★側管点滴（ﾚｼﾞﾒﾝ） 14:00-15:00　1時間かけて		
	毒 ★ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢NK｣(30mg 5mL)	80	88 mg/㎡
	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣(250mL)	1	本
	◆施行者F：ﾌｨﾙﾀｰ使用。		
	<<以下余白>>		

d1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
○							○							○													
○							○							○													
○																											
														○													
							○							○													
○																											

備考	